

ÚTSØLA

byrjar mánadagin 23. januar kl. 8,30

Bummulstógv

50 gr. noður

6,95

Nátúrtógv

100% ull — 100 gr. hespa

15,00

Maskintógv

100% akryl — 50 gr.

4,75

Sikina

100% akryl — fleiri litir
vanl. prísur 15,25

nú **8,00**

Velourtógv

vanl. prísur 22,75

nú **15,00**

v/ glitri 28,50

nú **18,00**

LOPI

1 tráð — 100 % ull
50 gr.

9,00

Heklitógv

50 gr. noður

9,00

Hosutógv

100 gr. hespa

15,-

Tweed Perle

Vanl. prísur 21,75

Madella

22,00

Petite Mohair

19,50

Fleiri litir

nú **12,00**

Vit hava eisini fleiri onnur góð tilboð av tógvi, hosum og øðrum.
Vit lata 10% av broderium, meðan útsølan er.

Tógvhandilin IGLOO,

Landavegur 2, Tórshavn, tlf. 15264

Restir av ymiskum slagi

til 1/2 prís

Gonore:

Til lækna skjótast

Tað er av størsta týðningi, at øll, sum halda seg møguliga vera smittað við gonore, venda sær til lækna sum skjótast, so sjúkan kann verða útihýst ella viðgjørd.

Verður hetta gjørt, koma vit í Føroyum bert at hava eitt litil tal av gonoresjúklingum, sigur landslæknin í seinnu grein sini um kynsjúkuna gonore.

Í 1983 vóru 60 tilburðir. Nóg fleiri enn árið fyri.

Fyrra greinin um gonore var í blaðnum týsdagin 17. januar.

Gonore hjá kvinnum

Sum nevnt vita helvtin av teimum kvinnum, ið verða smittaðar við gonore, ikki av, at tær ganga við sjúkuni. Kvinnur eru tí ofta sjúkar í longri tíð, áðrenn tær verða viðgjørðar, og

av hesi orsök gerst vandin hjá teimum fyri tilsløg (komplikationir) størri. Sjúkan hjá kvinnuni verður ofta ikki staðfest, fyrr enn hon verður givin upp sum kynsligt samband hjá einum smittaðum manni.

Tá sjúkueyðkenni eru, gera tey vanliga minni um seg enn hjá monnum. Sviði í samband við at vatna sær og eitt sindur av floti frá móðurskeiðini koma fyri.

Gonore hjá kvinnum kann breiða seg til eggjornina (eggjaleiðaran). Vanligastu sjúkueyðkenni eru tá feður og pina øðrumegin í búkinum. Kemur gonore í báðar eggjarnar, kann úrlitið gerast, at kvinnan seinni ikki kann fáa børn, gerst livs-steril.

Kvinnur kunnu eisini fáa gonore í baktarmin og — eins væl og menn — í munni.

Av og á kunnu kvinnur og menn fáa blóðeitran, bruna í liðir og aðrastaðir orsakað av gonore.

Sjúkuavgerðin

Sjúkan gonore verður staðfest við kanning hjá lækna av floti frá vatnræsismunna (og hjá kvinnum eisini livmóðurmunnna) undir sjóneyku ella við dyrking frá vatnræsismunnanum og møguliga aðra-staðir, ið verður tikin á ein sonevndan kolpotupinn, ið læknin sendir til kanningar á rannsóknarstovuni.

Til tess at kanna eftir um tekin eru til tilsløg, verða harumframt hjá-eista og blóðruhálskertil vanliga eftirkannaði hjá monnum og livmóðir og eggjorn hjá kvinnum.

Rættindi sjúklings-ins

Sambært lógina um kynsjúkurl í Føroyum hevur ein og hvør uttan mun til bústað og fíggjarorku rætt til ókeypis kanning fyri og viðgerð av kynsjúku hjá kommunulækna ella landslæknanum.

Skyldur sjúklings-ins

Fólk, ið vita ella hava orsök til at halda, at tey hava eina kynsjúku, hava skyldu til at lata seg kanna og møguliga viðgera fyri sjúkuna hjá lækna. Sumleiðis hava fólk skyldu til at siga læknanum navn sitt, yrki og bústað, eins og tey skulu geva upplýsingar um, hvør kann hava smittað tey, og hvørji tey kunnu hava smittað. Áður er nevnt, at ein stórir partur av fólki við gonore ikki vita, at tey hava sjúkuna, av tí at tey einki kenna til hana. Tað er tí sera umráðandi at fáa greiðu á, hvaðani smittan stavar, so øll við sjúkuni — eisini tey, ið ikki vita, at tey eru sjúk — verða kannað og viðgjørd. Læknin hevur tagnarskyldu.

Viðgerð av gonore

Hjá fólki, ið ikki eru ovur-

viðkvom (allergisk) móti penicillini, er besta viðgerðin at geva penicillin.

Í dag er vanliga viðgerðin at geva eitt serliga slag av penicillin (pivampicillin) sum tablettir. Givnar verða vanliga 4 tablettir samstundis, av tí at tað er týðningarmikið við sjúkuni gonore, at styrkin av penicillin í blóðinum verður nóg høg eitt styttri skifti. Harafturat verður eitt serligt evni — probenecid — eisini givið at taka inn. Hetta evnið tarnar úrskiljingini av penicillini gjøgnum nyrni. Við vanligari gonore verður hendan viðgerð givin bert eina ferð.

Eru tilsløg, eitt nú gonore í hjáeistum ella eggjornum (eggjaleiðarum), er vanligt at endurtaka nevndu viðgerð einaferð um samdøgrið í 5 ella 6 samdøgur.

Summir læknar geva viðgerð við penicillin sum innsprænging fyri gonore.

Fólk, ið ikki tola penicillin, kunna verða grødd við øðrum heilivági.

Vert er at endurtaka, at tað er av størsta týðningi, at øll, sum halda seg møguliga vera smittaði við gonore, venda sær til lækna sum skjótast til kanningar, so sjúkan kann verða útihýst ella viðgjørd.

Verður hetta gjørt, koma vit her í Føroyum framyvir bert at hava eitt litil tal av gonore árliga.

Lat okkum at enda gera vart við royndir í Danmark, ið benda á, at um tú hevur kynsligt samband við einum nýggjum persóni á tínum arbeiðs-plássi, millum kenningar ella tilíkt, er vandin fyri at fáa gonore umleið 5%. Og snýr tað seg um ein fyrri tær púra ókendan persón, er vandin umleið 25%.

Hóast hesi tøl kanska ikki eru tey somu í Føroyum, eiga tey kortini at verða havd í huga.