



STOVNSMETING SAMANFATAN

STOVNUR: Upsi undir Føroyum

Mynd 5
Gongdin í veiðu og roynd



Mynd 6
Gongdin í tilgongd og gýtingarstovni



stovninum. Vit sliggja, at góðu árgangirnir 1978 og 1980 finga gýtingarstovnin upp eftir, men harða royndin 1983 og 1984 hevur ført til, at stovnurin av stórum upsa, t.e. upsi eldri enn 5 ár, er minkaður

til tað lægsta, vit vita um. Við optimalari veiðu av upsa áttu bert 34% av stovninum at verið tikin um árið. Mett verður, at vit í 1984 tóku millum 45 og 50%.

Við óbroyttari roynd í

1985 varð met, at veiðan hetta árið fór at falla við uml. 10.000 tons. Fyri 1986 verður met, at veiðan við somu roynd sum í 1984 verður 43.000 tons. Um royndin beinanveg varð minkað niður í

tað optimala í 1986 hevði veiðan verið 27.000 tons.

Stovnsmetingar av svartkjafti

Arbeidsbólkurin viðvíkjandi svartkjafti hjá ICES

hittist í Keypmannahavn 25. sept.-3. okt. við tí endamáli at gera eina stovnsmeting av norðara svartkjaftastovninum (t.e. tann, ið gýtur vestan fyri Bretsku oyggjarnar og ferðast norðureftir at leita sær føði).

Veiðan í 1984 er fyrbils gjørd upp til 586.000 tons (mynd 7). Hetta er ein vøkstur í mun til 1983 uppá 47.000 tons ella sløk 9%. Størsti vøkturinn var í fiskiskapinum undir Føroyum og vestan fyri Bretsku oyggjarnar.

Til taks til stovnsmetingararbeiðið hevur arbeidsbólkurin 3 ekkometingar við fiskirannsóknarskipum, veiðuna í tali í aldursbólukum og veiðuna uppá veiðuorku í tíðarskeiðnum 1979-84 (mynd 8).

Tilgongdin til svartkjaftastovnin (mynd 9) hevur verið misjovn tey árinu tøl eru fyri.


Í árunum 1970-78 var hon í meðal 15 milliardir árliga (av 1 ára gomlum fiski), frá 1979-80 fall hon niður um 5 milliardir, meðan hon í 1982-83 var heilar 40 milliardir. Hetta saman við tí vaksandi fiskiskap-

inum síðst í sjeiti árunum hevur ávirkað støddina av stovninum nógv. Frá 3.5 milliónum tons í 1970 vaks gýtingarstovnurin av svartkjafti uppá nærum 7 milliónir tons í 1976-78, men síðani er hann minkaður ár undan ári til umleið 3.5 milliónir tons í 1984. Teir góðu árgangirnir frá 1982 og 1983 fara sambært stovnsmetingina at vaksa aftur um gýtingarstovnin í 1986 og 1987.

Royndin eftir svartkjafti vaks nógv síðst í sjeitiárunum, men er síðan minkað aftur (mynd 10), í 1984 var hon niðan fyri tað optimala. Við somu roynd í 1985 sum í 1984 verður roknað við, at veiðan verður um 700.000 tons. Fyri 1986 mælir ACFM til, at royndin ikki fer upp um tað optimala, og vil hetta geva eina samlaða veiðu uppá uml. 1.000.000 tons.


* Optimalt er her nýtt um ta roynd, sum loyvir fiskinum at vaksa upp til eina stødd, ið gevur størstu úrtøku í vekt úr stovninum.

VEIÐA AV SVARTKJAFTI NORÐARI STOVNUR 1974-84




Mynd 7. Veiða av svartkjafti (norðari stovnur) 1974-84. Á øllum skjum og í færoyskum sjógei.

FISKIDEYDAL SVARTKJAFTUR 1974-84




Mynd 10. Meðalfiskideydata (roynd) fyri svartkjaft 3 ár og eldri 1974-84.

VEIÐA PER VEIÐUORKU (TONS/TROLTIMA) 1979-84



Mynd 8. Meðalveiða per veiðuorku (tons/troltíma) í mai-oktober 1979-84 hjá russiskum og eysturtýskum skipum.

TILGONGD AV SVARTKJAFTI (1 ÁR) 1970-84



Mynd 9. Tilgongd av svartkjafti (1 ár) 1970-84.