

NAR DAR



MANNAGONGD

MORTAN ØSTERØ
MORTAN@SOSIALURIN.FO

Meting av barnsburðartíð

Longdin á barnsburðinum verður ásett eftir seinasta menstrationsdagin heldur enn nær kvinnan varð við barn – tað vil siga áleið 14 dagar áðrenn hon varð við barn. 12-vikumarkið fyri fosturtøku verður fyribils roknað eftir tí degnum.

Hjá kommunulæknanum

Kvinnan skal seta seg í samband í kommunulæknan, sum skal

staðfesta, at kvinnan er við barn. Kommunulæknin skal somuleiðis staðfesta, um kvinnan lýkur krøvini í lógini um fosturtøkur, og ger hon tað, verður hon víst á Landssjúkrahúsið. Harafturat skal kommunulæknin upplýsa um aðrar møguleikar enn fosturtøku.

Landssjúkrahúsið

Á Landssjúkrahúsinum, verður staðfest, um fostrið er í lívmóðurini ella uttan fyri. Tað verður gjørt við ultraljóðsskanning. Læknarnir á Landssjúkrahúsinum kanna eisini fyri klamydia. Hevur kvinnan kla-

mydia skal tað viðgerast áðrenn, tí annars er vandi fyri at klamydia brunin verður førdur í lívmóðrina, tá ið fostrið skal takast. Eisini her skal kvinnan tosa við læknin á Landssjúkrahúsinum, og hesin læknin skal eisini staðfesta, um kvinnan lýkur krøvini í lógini fyri at fáa fosturtøku. Metir læknin á Landssjúkrahúsinum, at kvinnan er egnað til fosturtøku, verður ein tíð sett av til fosturtøkuna.

Fosturtøkan

Í samráð við læknin skal kvinnan vanliga taka støðu til hvørt fost-

urtøkan skal fara fram við antin heilivági ella skurðviðgerð – tó er skurðviðgerðin siðvenja í Føroyum. Er kvinnan farin um níggju vikur, verður kvinnan vanliga innløgð, og heilivágur nýttur.

Við heilivágsviðgerðini, fær kvinnan tvær tablettir at taka. Tann fyrri steðgar barnsburðinum, meðan kvinnan tekur seinnu tablettina ein til tveir dagar seinni, ið fær fostrið út.

Við skurðviðgerðini, verður kvinnan doyvd og ein slanga førd gjøgnum lívmóðurhálsin upp í lívmóðrina. Síðani verður barnsburð-

urin sogin út gjøgnum slanguna, og varðar sjálv viðgerðin varðar um fimm til tiggju minuttir. Tá ið kvinnan vaknar, skal hon liggja undir eftiransing í tveir tímar.

Aftaná

Kvinnan skal fáa upplýsingar um hvat hon skal gera, um hon byrjar at fáa ilt í búkin ella fær fepur. Um hon skuldi blivið sjúk av fepri ella búkilsku teir næstu dagarnar, skal hon seta seg í samband við kommunulæknan, tí tá er vandin, at bruni er komin í undirlívið.