

UTTAN ÚR HEIMI

Veðurlagsbroytingarnar størri enn hildið

Fleiri frágreiðingar, sum eru lagdar fram á umhvørvisráðstevnuni í Buenos Aires í vikuni, benda á, at avleiðingarnar av veðurlagsbroytingunum eru størri, enn vísindin higartil hefur hildið

VEÐURLAG

Árni Joensen
fartekst@mail.dk

Ein av frágreiðingunum, sum kom á borðið í argentinska høvuðsstaðnum, var frá heimsnáttúrustovninum World Wildlife Foundation, og talan er greið. Stovnurin sigur, at nógð djórasløg eru ikki før fyri at laga seg til tær broyttu umstøðurnar, og at tað fer at fáa stórar avleiðingar fyri vistfrøðina. Orsøkin er í stuttum, at hitin á Jørðini veksur skjótari, enn náttúran megna at laga seg eftir.

Ein onnur frágreiðing var frá einum evropeiskum granskarabólki, sum starvast á tí viðurkenda veðurlagsstovninum í Potsdam í Týsklandi. Har verður ávarað um, at meðalhitin á Jørðini kann veksa heili tvey stig, og tað fer at fáa stórar avleiðingar. Eitt nú vænta evropeisku granskararnir, at vatntrot verður nógvastaðni í Mið- og Suðuramerika, at ódnirnar í Karibiska Havinum verða bæði fleiri og harðari, og at gróðrarlíkindini í Asia fara at versna.

– At meðalhitin veksur tvey stig er beinleiðis vandamikið fyri alla veðurlagsskipanina í heiminum, sigur Carlo Jager, sum er ein av granskarunum í Potsdam. Sambært Jager kunnu broytingarnar elva til, at heimshøvini fara at hækka fleiri metrar, og at umstøðurnar hjá fólki at lívbjarga sær fara at broytast nóg.

Sjón fyri søgn

Ein annar viðurkendur veðurlagsstovnur er tann bretska Hadley Center, og hann hevði eisini eina frágreiðing at leggja fyri ráðstevnuluttakararnar í Buenos Aires. Bretsku granskararnir hava við hjálp frá



telduskipanum kannað, hvussu nógð veðurlagið fer at broytast, og teirra niðurstøða er, at meðalhitin á Jørðini fer helst at veksa 2,8 stig í hesari øldini. Fyritreitin fyri hesum er, at dálkingin verður tvær ferðir so stór sum nú.

Einki land dálkar so illa sum USA, og á ráðstevnuni í Buenos Aires segði formaðurin í teirri serligu veðurlagsnevndini hjá ST, Rajendra K. Pachauri, at frágreiðingarnar hjá serfrøðingunum vísa týðiliga, at amerikanararnir mistaka seg, tá teir halda uppá, at ásetingarnar í Kyoto-sátt-

málanum hava einki við vísindi at gera.

– Vit hava fingið so nógð og so góð prógv, at tað ber illa til at lata eyguni aftur fyri tí, sum er í ferð við at henda, segði Pachauri á ráðstevnuni. Sjálvur er hann ættaður úr fjallalendinum í India, og har hefur hann sæð mong dømi um, hvussu tann veksandi hitin hefur broytt náttúruna.

Veðurlagsnevndin hjá ST hefur skotið upp, at alt verður gjørt fyri at tálma tí veksandi hitanum á Jørðini, og at málið er at avmarka vøksturinn til í mesta lagi tvey stig. Tað eru tó ikki

øll, sum eru nøgd við hetta. Eitt nú heldur World Wildlife Foundation, at vøksturinn eigur ikki at vera meiri enn hálvtannað stig.

Skjótari enn hildið

Niðurlandski lívfrøðingurin Arnold Van Vliet, sum starvast á lærda háskúlanum í Wageningen, hefur í sínari frágreiðing til ráðstevnuna í Buenos Aires eina meting av, hvat fer at henda í komandi árum.

Eitt nú væntar hann, at vit skulu venja okkum við, at tað fer at grógva fyrr á árinum, enn vit eru von við.

Nógvastaðni verður tað turrari enn nú, og tað fer at elva til fleiri skógareldar. Ísurin í teimum høgu fjøllunum og í póløkjunum fer at bráðna, og nógð djórasløg fara at doyggja út.

– Okkara kannning vísir, at tað er ikki bara meðalhitin, sum er avgerandi fyri, hvussu náttúran megna at laga seg eftir umstøðunum. Broytingar í sjálvum veðrinum hava eisini stóra ávirkan, sigur Arnold Van Vliet. Hann væntar eisini, at broytingarnar fara at vísa seg skjótari, enn vísindin higartil hefur hildið.

Landslagið í Grønlandi fer at broytast nógð í komandi árum, hava veðurfrøðingarnir rætt. Men veðurlagsbroytingarnar fara eisini at merkjast aðrastaðni í heiminum

Nógð djórasløg doyggja út

Amerikanskir granskarar siga í einari nýggjari frágreiðing, at nógð fuglasløg fara at doyggja út í komandi árum.

– Okkara kanningar vísa, at í hesari øldini fara kanska heili 14 prosent av heimsins fuglasløgum at doyggja út. Tað merkir, at um næsta aldarskiftið verða umleið 1200 færri fuglasløg enn í dag, stendur í frágreiðingini, sum granskarar á lærda Stanford-háskúlanum í Kalifornia hava skrivað.

Amerikonsku granskararnir siga, at tann stóri fugladeyðin fer at fáa stóra ávirkan á vistfrøðina nógvastaðni.

Aðrir granskarar hava fyrr víst á, at veðurlagsbroytingarnar fara eisini at hava við sær, at nógð súgdjórasløg fara at doyggja út. Eitt nú hava teir skrásett, at av summum djórasløgum er stovnurin minkaður heili 25 prosent tey seinnu árin.

Tað sama er galdandi fyri djórini í havinum. Granskararnir vilja millum annað vera við, at triðja hvørt skjaldbøkuslag er í vanda fyri at doyggja út.