

Ókeypís koppseting ímóti pneumokokkum

Mælt verður til, at fólk, ið eru 65 ár og eldri, og fólk við varandi sjúku ella sum av øðrum orsøkum eru í øktum vanda fyri at fáa lungnabruna, lata seg koppseta ímóti pneumokokkum.

Fá meiri kunning á
heilsutrygd.fo

Tilboð um ókeypís koppseting ímóti pneumokokkum verður veitt til fylgjandi persónar, ið eru búsitandi í Føroyum

- 1) Persónar, sum fáa bútilboð, sum eru skipað sambært §§ 27, 32 og 32 e í forsorgarlógini og sambært § 13, stk. 2, nr. 1, 2 og 3 í løgtingslóg um heimatænastu, eldrarøkt v.m.
- 2) Persónar, sum hava fylt 65 ár.
- 3) Persónar, sum hava eina av hesum varandi sjúkum, ið nevndar eru undir litra a-h, eftir eini læknaflagari meting.
 - a) Persónar uttan milt, ella har miltið ikki virkar, sum tað skal.
 - b) Persónar, har andadrátturin er ávirkaður av, at vøddamegin er niðursett.
 - c) Persónar, sum hava órinsbrek, immundefekt, ið antin er viðfødd ella íkomin.
 - d) Persónar við leka av heilavætu, liquorlækage.
 - e) Persónar, sum hava havt invasiva pneumokokksjúku, pneumokokkbruna í blóðinum ella pneumokokk-meningitis.
 - f) Persónar, sum hava fingið Cochlear implantatión.
 - g) Persónar, sum hava fingið upprunakyknuflutning, stamcelletransplantation.
 - h) Persónar, sum hava fingið yrkisgagnsflutning, organtransplantation.
- 4) Persónar yngri enn 18 ár, sum hava sjúku ella støðu, ið hevur við sær sera stóran vanda fyri at fáa invasiva pneumokokksjúku, ið eru nevndar undir litra a-h, eftir eini læknaflagari meting.
 - a) Persónar við hjartasjúku, ið hevur við sær niðursetta iltmettan í blóðinum, cyanotiske hjertesygdomme.
 - b) Persónar, sum hava hjartaviknan, hjerteinsufficiens.
 - c) Persónar, sum hava fingið palliativa skurðviðgerð fyri hjartasjúku.
 - d) Persónar, sum hava týðandi fylgir á blóðrenslid eftir hjartaskurðviðgerð.
 - e) Persónar við varandi lungnalíðing, t.d. cystiska fibrosu.
 - f) Persónar, sum hava niðursett lungnavirkni, orsakað av veikum andadráttsvøddum, hypodynamisk respirationsinsufficiens.
 - g) Persónar, sum hava nefrotisk sjúkueyðkenni, nefrotisk syndrom.
 - h) Persónar, sum hava órinsverjubrek, immundefekter, undantikið agammaglobulinæmi og SCID.
- 5) Persónar, sum hava aðrar álvarsamar sjúkur ella eru í eini hættislagari støðu, sum eftir ítökiligum meting læknans, hevur við sær sera stóran vanda fyri at fáa invasiva pneumokokksjúku.

Ert tú í iva, set teg í samband við egnan kommunulækna.