



Lagt til rættis: Dorit
Hansen og Rigmor Dam

Ítøkiligar staðfestar avleiðingar av veðurlagsbroytingum

- Kavin og ísurin í Arktis bráðnar skjótari, og ávirkar hetta beinleiðis natúrligu vistskipanirnar
- Árstíðirnar byrja fyrr. Hetta sæst millum annað á nøgdini av blómusáði í luftini
- Jarðarlagið er leysari í fjallalendi og í økjum við permafrosti
- Tað eru fleiri skriðu- og skalvalop í fjallalendum
- Broyingar eru í flora og fauna í Arktis og Antarktis
- Kavin tíðnar fyrr, og elvir til vatnmangul seinni á árinum
- Ein upphiting er farin fram av áum og vøtnum, sum ávirka vatngóðskuna
- Leysprettir, fuglaflyting og verping eru eisini framskundað
- Gróður og djóralív flyta seg móti póløkini og upp í hægri landsløg
- Drúgvri vakstrartíðarskeið hevur eisini við sær meira CO₂ í loftrúmið, sum aftur hevur við sær meiri plantuvøkstur
- Broyingar í hitanum í havinum saman við broyingum í ísløgum og javnváganum millum salt og súrevni hava eisini við sær broyingar í algu-, æti- og fiskanøgðum í havøkjum í norðara parti av heiminum
- Fólk doyggja vegna hita í Europa
- Ávísar smittandi sjúkur gera meira um seg

Ávaring: Veðurlagið broytist

Í 1988 setti ST á stovn eitt millumtjóða veðurlagspanel, IPCC. Fýra frágreiðingar eru útgivnar, tann seinasta í 2007. Her er eitt yvirlit yvir tær týðningarmestu niðurstøðurnar frá hesari frágreiðing

Niðurstøðan í ST-frágreiðingini er greið: Skaðiligu evnini, sum vit menniskju lata út í loftrúmið, eru orsökini til nógvu veðurlagsbroytingarnar. Til ber at tálma gongdini, um farið verður til verka nú. Sostatt liggur tann spurningurin ikki í buktini longur.

Síðani fyrstu frágreiðingina frá IPCC í 2001 eru stór framstig hend í mun útrokningina av framtíðar veðurlagsbroytingum. Hetta bæði tí, at fleiri veðurlagsmodellir og fleiri kanningar eru tøk- ar.

Fleiri túsund granskarar eru við í frágreiðingini, sum varðalmanakunnigjörd síðst í januar í 2007.

Hitin ger um seg

Miðalhiti á jørðini er hækkaður við 0,74°C seinastu hundrað árin. Og tað eru serliga tey seinastu árin, at hitin er hækkaður nóg. 11 tey heitastu árin síðani hita- mátingar byrjaðu í 19. öld eru skrásett innanfyri tey seinastu 12 árin.

Eisini er staðfest, at ísur bráðnar og havið er hækkað

við 17 centimetrum í 20. öld. Eisini her er vøksturin størstur tey seinastu árin, har vatnstøðan er hækkað við 3,1 millimetri um árið seinastu 10 árin. Arktiski havisurin er minkaður við 20 prosentum síðani 1978.

Mongdin av avfallið er eisini broytt. Onkrastaðni er avfallið økt, meðan turkur er vorðin meira umfatandi aðra staðni. Men ikki alt er broytt. Til dømis er munurin millum dag- og náttarhita ikki broyttur, og havisurin og veðurlagið við Antarktis tykjast heldur ikki at vera serliga nógv ávirkað.

Mesta upphitingin er har, sum land er, umframt á norðastu leiðunum. Minsta upphitingin er yvir Suður- høvini og partar av Norður- atlantshavinum. Í arktisku økjum minkar kavanøgðin, og har permafrostur er, tíðnar ísurin. Summar fram- rokningar spáa, at ísurin í Arktis nærur tíðnar heilt burtur summarhálvuna.

Náttúran ella menniskjan

Upphitningin er eitt úrslit av

øktum vakstrarhúsgassi og aerosoldusti í atmosferu, sólarljósi og jarðarskorpu. Hetta er aftur eitt úrslit av, at kuldioxid, metan og láturgass er hækkað munandi síðani 1750.

Vøksturin í koltvíltu stav- ar millum annað frá nýtslu av steinrunnum brenni – kol, olju og natúrgassi, meðan vøksturin í metan og láturgassi serliga stavar frá landbúnaði.

IPCC frágreiðingin sigur, at tað er meiri enn sannlíkt, at økta upphitingin síðani mitt í 20. öld stavar frá menniskjaskaptum útláti av vakstrarhúsgassi, og at hes- ar broyingar ganga skjótari enn fyrst hildið.

Millum 1970 og 2004 hækkaði samlaða útlátið av vakstrarhúsgassum við 70 prosentum. Verða politisk tiltøk ikki sett í verk, verður roknað við, at hetta talið hækkar við 25-90 prosent- um í 2030 í mun til 2000.

Um útlátið av vakstrar- húsgassum og aerosol dusti ikki fer upp um tað, sum tað var í ár 2000, so verður vøksturin hildin niðri á 0,1°C fyri hvørt tíggjunda

ár. Men um útlátið ikki verður tálmað, verður hitavøkst- urin dupult so stórur. Og tá verða veðurlagsbroytingar- nar í 21. öld enn størri enn broyingarnar í 20. öld.

Vatnstøða og havstreymar

Vakstrarhúsútlátini ávirka eisini vatnstøðuna á høvu- num. Um væl stendur til, og útlátið av vakstrarhús- gassum ikki veksur, vísa framrokningar, at havið fer at hækka við 18 centimetrum í 2090-2099. Men um vøkst- urin í útláti heldur fram sum higartil, kann havið hækka við upp til 59 cm.

Verður núverandi gongd framroknað enn longur inn í framtíðina, kann innlands- ísurin hvørva og havið hækka upp í 7 metrar. Modelútrokningar vísa tó, at ísurin á suðarpólinum hinvegin kann vaksa, tí veðurlagið har ikki broytist, meðan avfallið veksur.

Vandin fyri tí óvæntaða, sum til dømis, at Golf- streymurin minkar burtur ella kúvendir, er eisini við- gjørdur í frágreiðingini.

