

er ikki føroyskur



Her er sukurtarin avmyndaður vaksandi á einum togi, sum hongur niður úr eini boyðu

variatiún av tarum, ið er tengd at bæði árstíðini og umhvørvinum, sum tarin livir í, hevur hetta bert verið enn truplari.



Sukurtari við sínum eyðkenda rúkkuta og avlanga blaðið liggur á turrum, meðan tað fjarðar – ein heldur óvanlig sjón

Man veit t.d. at Laminaria-tarasløg, sum eru útsett fyrri nógvari aldu, hava nóg styttri stelk, enn hvat teir vanliga hava, tá tarin er í einum meira vardum øki. Blaðið er ofta eisini smálri og týkkri, og stelkurin meira hulin, har tað er aldubart. Morfologisk variatiún er eitt rættuliga kent fyrbrigdi í lívfrøðini, og tað eru nógvir ymiskir faktorar, ið gera tað trupult at seta tvær strikur undir úrslitið.

Sukurtarin, og tískil eisini Føroyatarin, livir best í einum økið, har rákið ikki er ov stórt, og streymurin ikki ov harður. Vanliga sigur man, at teir finnast á 3 til 15 metra dýpið í vardum til miðal aldubardum økjum.

Krossing

Tá tað finst so stór variatiún millum Laminaria-sløgini, eru fleiri royndir gjørdar, har man hevur krossað tarasløgini. Hetta fyri at vísja, at talan ikki er um krossparing millum sløgini. Tað hevur eyðnast at fingið livandi tara í hesum royndum. Men allir hesir tararnir hava verið sterilir,

og kunnu tískil ikki rokna sum eitt millumlið millum artinar. Eitt slag verður allýst sum ein bólkur av verum, ið kunnu parast við hvørjum øðrum og fáa fruktagott avkom.


Man helt annars, at hetta kundi verið støðan hjá føroyska taranum. Men so var ikki.

Tann føroyski tarin, sum Fredrik Børgesen fann í Føroyum í 1896 er seinni eisini funnin í Íslandi. Og við hesum verður allur ivi um tann serføroyska tara staðfestur og vísur, at tað skulu bert nakrir serligir umhvørvisfaktorar vera tilstaðar fyrri at finna hesa variatiúnina av sukurtaranum.

Fakta: Tari – sera ólík syskinabørn

Tari er bólkaður saman algum við í evolutionera lívs ættartrænum. Algur og tari eru ikki ein monofyletisk eind, t.v.s. at tey eru ikki ættaði úr somu grein í fylogenetiska ættartrænum. Fylogenetikkur er ættargransking millum ymiskar bólkur av verum (t.d. slag). Hetta verður gjørt við ílegugranskingar úrslitum og morfologiskum útgreiningum. Tarar hava eins og blómplanturnar á landi evnir at ljóssamevna. Men tarar kunnu ikki samanberast við plantur, tí teir hava

ikki rót, legg og blað, sum blómplanturnar hava. Eisini víkur formeringin hjá tarum heilt frá formeringini hjá blómplantunum. Harafturat taka tararnir ikki tøðevnir úr jørðini. Tari er oftast festur í steinar ella hellubotn, og tískil upptekur tarin tøðevnir beinleiðis úr sjónum. Tari hevur festi, stelk og blað. Festið syrgir fyrri, at tarin situr fastur. Stelkurin, sum er elastiskur og sterkur, ansar eftir, at tarin ikki verður skræddur leysur av aldum, meðan blaðið upptekur tøðevnir.



Fylogenetiska lívstræðið. Tararnir eru markeraðir við svørtum