



Lise Helen Ofstad
Marinbiolog
Havstovan

Gullaksur f

Vassildfiskeri, det første færøyske fiskeri som kan smykke seg med kvalitetsstempelen "bæredyktig fangst". Bak dette smykket ligger en estimering av vassildbestandens ve og vel som viser at det per i dag ikke høstes mer enn det produseres. Det skal tilføyes at den Internasjonale Havforskningen (ICES) ennå ikke har godkjent denne vurderingen



Det hele startet med at tiden for søknadsfristen til prosjektpenger fra "Fiskivinnuroyndir" i 2005 nærmet seg med store steg. Vassild var et tema, som vi på Havstovan så gjerne ville ha mer viten om, fordi en tidsserie med lengder og alder av vassild fra landingene viste en alarmerende nedgang i gjennomsnittsstørrelsen bare på de første fem årene etter at fiskeriet startet. I tillegg var det mange ubesvarte spørsmål om vassild angående viktige faktorer som blant annet

vekst, modning og hvor store de er første gang de gyter. Etter en ringerunde rundt til forskjellige redere og industrifolk var en kontakt skapt og kravene til en søknad fra "Fiskivinnuroyndir" var oppfylt. Søknaden ble skrevet og den ble gått i møte. Prosjektet ble finansiert av "Fiskivinnuroyndir", Havstovan, Tavan, Polarhav, Stjørnan, Eysturbúgvín og JFK.

Færøysk vassildfiskeri

Direkte fiskeri etter vassild i

færøysk område startet i 1995. Landingene varierte rundt 8.000 tonn de første ti årene, med enkelte unntak. I de seneste årene har det vært en stor økning i fangsten av vassild, fra 7.000 tonn i 2005 til 19.000 tonn i 2008. Det blir også fanget endel vassild som bifangst i kolmulefiskeriet og i dypvannsfiske etter foreksempel uer (kongafiskur) og blålange.

Vassildfiskeriet er begrenset av antall fiskerilisenser, stengte områder og andel bifangst. Som oftest er det to par partrålere

som fisker vassild, men i de seneste årene har det vært tre par. Fiskeområdet er i hovedsak vest for Færøyene og ved kanten av Føroyabanka, på 400 til 600 meters dyp. I de fleste årene har fiskeriet vart fra april til september. Trålen som brukes er en spesiell småmasket flytetrål.

Naturlig tilpasning

Da fiskeriet startet var gjennomsnittsalderen av vassild i fangsten 13 år og noen år senere var denne alderen redusert med

fire år. Denne reduksjonen gjenspeiles også i størrelsen på vassildene. Det er to teorier som kan forklare dette. Den første er at det fiskes for mye vassild, slik at fiskepresset blir for stort og den andre er at det hender en naturlig tilpasning i bestanden til det nye fiskeriet. Siden 2001 er denne reduksjonen så og si stagnert, så nedgangen i alder og størrelse forklares som en naturlig tilpasning til et nytt fiskeri.

Når en fiskebestand ikke blir fisket, vil alle individene få god