


Eftirlit við alnetinum

Í Hvítarusslandi eru tíðindafólk og politisk and-støðufólk í øðini inn á Alexander Lukasénko, for-seta, sum hevur gjørt av at herða tað almenna eftir-litið við, hvussu landsins íbúgvar brúka alnetið. Sambært fjølmiðlunum fer stigið hjá forsetanum at gera enda á tí seinasta frælsinum, sum fjølmiðlarnir higartil hava havt. Tann nýggja lógin ásetir millum annað, at tey, sum hava heimasíður, skulu kunna tað almenna eftirlitið um, hvør vitjar heimasíðurnar, og hvørjum tey hyggja eftir.



Fríkendur av dna

Fyri trimum árum síðani bleiv spaniumaðurin Ricardo Santiago Collado dømdur 36 ára fongsul fyri at hava neyðtikið triggjar ungar gentur í Las Palmas á Kanarisku Oyggunum í 1997. Men í gjár ógildaði spanski hægsti-rættur dómin og gav boð um, at maðurin skal latast leysur alt fyri eitt. Orsøkin er, at dna-royndir hava prógvað, at tað var ikki Ricardo Santioago Collado, sum neyðtók genturnar. Tær triggjar genturnar vóru millum 15 og 17 ára gamlar, og í rættinum bleiv Collado dømdur 12 ára fongsul fyrio hvørja neyðtøku. Hann hevði sitið hálvt triðja ár av dóminum, nú hann bleiv fríkendur.

Øktur sjóvarhiti órógvar

Um hitin í sjónum heldur fram at økjast, kann hetta órógva vistskipanina í føroyskum sjógvi. Longu nú kunnu broytingar staðfestast, har fiskasløg hava flutt seg. - Útbreiðslu-mynstrið hjá summum fiskasløgum er broytt seinastu árin, og helst er tað økti hitin í sjónum, sum er orsøkin til fyrbrigdið, siga tveir nýggir føroyskir bio-logar, Hannipoula Olsen og Helga Bára Mohr Vang

NÁTTÚRA

Vilmund Jacobsen
vilmund@sosialurin.fo

Árini 1994-2008 tók hav-rannsóknarskipið Magnus Heinason tilsamans 4.076 yvirlitstrolstøðir á føroyska landgrunninum, 1.478 um várið og 2.598 um heystið. Við støði í hesum kann-ingum ber til at staðfesta, um fiskurin undir Føroyum hevur flutt seg seinastu árin. Frá 1994-2008 hevur toskurin á landgrunninum týðiliga flutt seg eystureftir um várarnar. Hendan broyt-ing sæst tó ikki hjá toskinum um heystið. Meðan tann stóri kongafiskurin hevur flutt seg á djúpri vatn og meiri vestureftir, hevur trantkongafiskurin flutt seg á grynri vatn og meira eystureftir.

Hetta er nakað av tí, sum kann lesast í einari nýggjari ritgerð, sum Hannipoula Olsen og Helga Báru Mohr Vang júst hava latið úr hondum í samband við teirra bacherlorútbúgving í livfrøði á Náttúruvísindadeildini á Fróðskaparsetrinum.

Heitið á ritgerðini hjá teimum er:

“Effects of marine climate on the spatial distribution of fish species on the Faroe Shelf”.



Ritgerðin snýr seg um, hvørjaávirkan broytingarnar í havumhvørvinum hava á útbreiðsluna av fiski á føroyska landgrunninum.

Heitari sjógvur

Í áhugaverdri grein, sum Eyðfinn Magnussen, ið starvast á Náttúruvísinda-deildini hjá Fróðskapar-setrinum hevur skrivað, verður víst til ritgerðina hjá nýggju biologunum.

- Hesi seinastu árin er sjógvurin í Norðuratlants-havi vorðin alsamt heitari. Hitamátingar av sjónum við Oyrargjógv vísa, at í 1993 var miðalhitin fyri alt árið 7,4 stig, men í 2003 var hann hækkaður 1,4 stig - upp til 8,8 stig. Eftir hetta er hitin lækkaður aftur, og í 2008 var hann 8,4 stig. Eisini í Norð-sjónum er sjógvurin vorðin heitari. Árini 1977-2001 hækkaði miðalhitin í Norð-sjónum 1,05 stig.

Í greinini hjá Eyðfinni Magnussen, sum byggir á



Tvær fegnar fiskagentur, Hannipoula Olsen og Helga Bára Mohr Vang, sum júst hava fingið handað prógv við fyri teirra avrik

ritgerðina hjá nýggju biologunum, verður víst á, at fiskurin flýggjar undan hitanum

- Tá sjógvurin gerst heit-

ari, broytast livilíkindini hjá fiski, og tað ávirkar útbreiðslumynstrið. Tey fiska-sløg, sum trívast í heitari sjógvi, kunnu flyta seg

norðureftir, tí livilíkindini í hesum økinum nú eru vorð-in betri. Hjá teimum fiska-sløgnum, sum liva í kaldari sjógvi, versna livilíkindini.

Hesi kunnu flýggja undan hitanum, antin við at flyta seg longur norður, ella við at fara á djúpri vatn, har sjógvurin er kaldari.

Við ritgerðini sum grund-arlagi, vísir Eyðfinn Magnussen eisini til kann-ingar av fiski í Norðsjónum. Hesar vísa, at sjálvur kjarnin í útbreiðsluøkinum hjá nærum 2/3 av fiska-sløgnum í Norðsjónum hevur flutt seg.

- Í flestu førum hava fiskasløgini flutt seg longur norður, men tað eru eisini tey, sum hava flutt seg suðureftir, og onkur teirra standa djúpri í dag enn fyri 25 árum síðani.

Í ritgerðini verður spurningurin reistur, hvussu stóðan er undir Føroyum, og um útbreiðslumynstrið hjá fiski eisini er broytt um okkara leiðir?

Hetta vildu Hannipoula og Helga Bára finna út av í sínum kanninum og ritgerð.

Við støði í yvirlitstroling-unum hjá Magnusi Heina-