

...4 HARUR BLIVU TIL 5000


VEKT

Gongdin seinastu árinu hevur verið, at miðalvektin á harunum er minkandi. Staðfestast kann tó, at størstu harurnar liva á Sandoyinni og tær minstu í grannaoyinni, Skúvoy. Henda haran sær eisini gott út, og smakkar helst eisini væl

Mynd: Jens Kristian Vang

at tær vóru so spakar, at tær komu heilt inn í garðarnar hjá fólki at finna sær føði.

Eitt serstakt var við hesum fyrstu harunum, – eitt sum ein í fyrsta umfari ikki gav sær far um: Tær vóru allar hvítar á liti um vetrinum, men vórðu seinni trokaðar burtur av teimum bláu. Óhugsandi er ikki, at onkur av innfluttu harunum hevur havt eitt slíkt iborið lit-gen.

Sambært okkara fyrsta djóralækna, Carl Johan Bech varð tann seinasta hvíta haran – snjóharan – skotin veturin 1916-17. Hetta gevur haraftrat orsök til eina aðra áhugaverda eygleiðing, tí haran hevur í roynd og veru tvey litfrábrigdi.

Tær snjóharurnar sum reika norðuri í Mið- og Norðurnoregi og í Alpunum hava ein snjóhvítan vetrarbúna, meðan harurnar í Føroyum, Skotlandi, Írlandi, Suðurnoregi og Suðursvøriki hava ein ljósagráan vetrarbúna.

Tríggjar lögur

Granskarar í dag høvdu helst ynskt, at eitt sindur meiri var skrivað tá, fyrri 155 árum síðani, um hesar fyrstu harurnar – til dømis um kyn teirra.

Tað er nevniliga ikki heilt einfalt at avgera kyn á haru, og tað arbeiðið varð tíverri ikki gjørt í 1850'unum. Tí vita vit ikki hvussu kynsbýtið var á hesum fyrstu átta harunum. Sagt verður, at lættast er at avgera

» **Sambært okkara fyrsta djóralækna, Carl Johan Bech varð tann seinasta hvíta haran – snjóharan – skotin veturin 1916-17**

kynið, tá hon verður flett. Tá ið skinnið verður togað av, síggjast eistuni týðiliga á kallharuni.

Staðfestast kann tó, at kynsbýtið av haruni, og umstøðurnar at eiga og føða, vóru hesum fyrstu norsku harunum til vildar í føroysku náttúruni. Bert tíggju ár seinni vórðu túsundtals harur taldar.

Hetta kemur vist ikki av ongum, tí haran sum er kynsbúgvinn eftir bert átta mánaðum, leggur tríggjar ferðir um árið, einar 2-3 ungar hvørja ferð. Fyrsta lógan er í februar/mars; onnur í mai/juni og triðja í august/september.

Stovnurin verður á mangar máttar hildin niðri av rovfugli, men tað munnu kortini vera harumenn sum taka flestu harurnar ta tíðina,

ið loyvt er at skjóta.

Henda tíðina er skift ár undan ári. Tey fyrstu árinu heilt frá 1. oktober til 14. februar í 1881, frá 3. november til 3. desember í 1969 til í dag, nú tað er vorðið loyvt at skjóta haru frá 2. november og 31. desember.

Tað vil so aftur siga, at verður veðrið til vildar 2. november, er líkt til at nógvir menn fara at fáa sær ein frídag fyri at fara á haruveiðu á fyrsta sinni í ár.

snorri@sosialurin.fo

(Heimildir: Fyrst og fremst Dorete Bloch, leiðara á Djóradeildini; Náttúrugripasavnið; internetið o.a.)